

ADIARIX® DUO

Loperamide chlorhydrate/Simeticone - 2/125mg



PRESENTATION

Ce médicament se présente sous forme de 10 comprimés sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION

Loperamide chlorhydrate 2mg
Quantité correspondant à l'opéramide base 1,86 mg
Simeticone 125 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Ce médicament est un anti-diarrhéique ralentisseur du transit.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

ADIARIX® Duo est indiqué dans le traitement symptomatique de la diarrhée aiguë de l'adulte et de l'adolescent de plus de 12 ans avec gêne abdominale liée à la présence de gaz : ballonnements, douleurs spasmodiques ou flatulence.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au loperamide, simeticone ou à l'un des autres composants d'ADIARIX® Duo
- Crise aiguë de rectocolite hémorragique ;
- Diarrhée due à certains antibiotiques ;
- Diarrhée s'accompagnant de torpeur, de soif, de fièvre ou de sang dans les selles ;
- Si vous êtes constipé ou en cas de gonflement abdominal.
- Enfant de moins de 12 ans.

Ce médicament ne doit pas être employé sans avis médical en cas d'insuffisance hépatique et chez les personnes infectées par le VIH.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

- Insuffisance hépatique
- Distension abdominale
- Porteur de virus SIDA

Ce médicament traite uniquement les symptômes de la diarrhée. En cas de diarrhée (sévère), une perte hydroélectrolytique peut survenir. Il est important d'attirer l'attention sur une réhydratation appropriée avec apport d'électrolytes.

Si une amélioration clinique n'est pas observée dans les 48 heures, il convient d'arrêter le traitement. Les patients devront être avertis dans ce cas, qu'ils doivent consulter leur médecin.

Le traitement doit être arrêté dès que les selles recommencent à être formées ou en cas de survenue d'un gonflement abdominal. L'usage trop prolongé du médicament expose à un risque de constipation grave.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Mode d'administration :

ADIARIX® Duo s'administre par voie orale.

Posologie :

Adultes de plus de 18 ans : Prendre d'abord 2 comprimés, puis un comprimé après chaque selle non moulée. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour.

Adolescents de 12 à 18 ans : Prendre d'abord 1 comprimé, puis un comprimé après chaque selle non moulée. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour. Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 ans.

Insuffisance hépatique :

L'utilisation d'ADIARIX® Duo doit se faire avec précaution chez les patients insuffisants hépatiques du fait de la diminution de l'effet du premier passage hépatique.

Durée de traitement :

Durée de traitement est limitée à 2 jours

Si les symptômes persistent après 2 jours de traitement, arrêtez le médicament et contactez votre médecin.

SURDOSAGE

En cas de surdosage : Dépression du système nerveux central, sécheresse de la bouche, gêne abdominale, nausée et vomissement, constipation, rétention urinaire et un iléus paralytique peuvent être observés.

Le loperamide peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

Les enfants peuvent être plus sensibles que les adultes aux effets sur le système nerveux central.

Si des symptômes de surdosage apparaissent, la naloxone peut être prise comme antidote.

CONDUITE DE VEHICULE ET UTILISATION DE MACHINES

Il est conseillé d'être prudent en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

ADIARIX® Duo est déconseillé pendant la grossesse sans avis médical en particulier pendant le premier trimestre.

ADIARIX® Duo est déconseillé pendant l'allaitement, du fait du faible passage du loperamide dans le lait maternel.

Il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

L'administration concomitante de loperamide à des concentrations élevées avec la quinidine, le Ritonavir, l'Itraconazole et le Gemfibrozil, Ketoconazole montrent une augmentation de la concentration plasmatique du loperamide.

L'administration concomitante de loperamide et la desmopressine augmente les concentrations plasmatiques de la desmopressine.

Aucune interaction clinique significative entre la simeticone et d'autres médicaments n'est attendue.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

Liés à la présence de loperamide :

- Fréquents : nausées, flatulence, maux de tête, altération du goût
- Peu fréquents : somnolence, vertige, constipation, indigestion, flatulence, vomissements, bouche sèche, éruption cutanée.
- Rares : Perte ou diminution de conscience, éruption cutanée, urticaire, démangeaison, fatigue.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans son emballage d'origine.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à une prescription médicale

DE N° :

Date de révision de la notice : MAI 2020

DE N°





أدياريكس[®] ديو

لوبيراميد كلورهيدرات/ سيمتيكون 125/2 مغ

شكل وتقديم

أقراص عن طريق الفم، علبة تحتوي على 10 أقراص

التركيب

لوبيراميد كلورهيدرات 2 مغ
الكمية المعادلة للوبيراميد القاعدي 1,86 مغ
سيمتيكون 125 مغ
سواغ لكل 1 قرص

الفئة العلاجية

هذا الدواء مضاد للإسهال من خلال إبطاء الحركة المعوية.

دواعي الاستعمال

يستعمل أدياريكس[®] ديو لعلاج أعراض الإسهال الحاد عند البالغين والمرافقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً مع عدم الراحة في البطن المرتبطة بوجود الغازات : الانتفاخ أو آلام التشنج أو انتفاخ البطن.

موانع الاستعمال

لا يستخدم هذا الدواء في الحالات التالية :

- حساسية مفرطة للوبيراميد، سيمتيكون أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء
- التهاب حاد القولون التقرحي.
- الإسهال بسبب بعض المضادات الحيوية.
- إسهال مصحوب بالغثاس أو العطش أو الحمى أو الدم في البراز.
- إذا كنت تعاني من الإمساك أو لديك تورم في البطن.
- الأطفال الأقل من 12 سنة.

لا ينبغي استخدام هذا الدواء دون نصيحة طبية في المرضى الذين يعانون من اختلال كبدي وفي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

- فشل الكبد

- انتفاخ البطن

- حامل لفيروس الإيدز

هذا الدواء يعالج فقط أعراض الإسهال ؛ في حالة الإسهال الشديد قد يحدث فقدان كهربي (مائي- شاردلي)، من المهم لفت الانتباه إلى الإماهة المناسبة مع إمداد الشوارد.

إذا لم يلاحظ تحسن في الحالة الصحية في 48 ساعة، يجب إيقاف العلاج و استشارة الطبيب.

يجب إيقاف العلاج بمجرد بداية تشكل البراز مرة أخرى أو في حالة حدوث تورم في البطن. الاستخدام المفرط لهذا الدواء يعرض صاحبه لخطر الإمساك الشديد.

الجرعة وطريقة الاستعمال

طريقة الاستعمال

يأخذ أدياريكس[®] ديو عن طريق الفم.

الجرعة

الكبار فوق 18 سنة : أولاً تناول قرصين، ثم قرصاً واحداً بعد كل برز سائل. لا تتجاوز 4 أقراص يومياً.

المرافقين 12-18 سنة : أولاً تناول قرصاً واحداً، ثم قرصاً واحداً بعد كل برز سائل. لا تتجاوز 4 أقراص يومياً يمنع.

استخدام هذا الدواء عند الأطفال دون سن 12 عاماً

فشل الكبد

يجب استخدام أدياريكس[®] ديو بحذر عند مرضى الفشل الكبدية بسبب انخفاض التأثير الأول للكبد.

مدة العلاج

تقتصر مدة العلاج على يومين.

إذا استمرت الأعراض بعد يومين من العلاج ، فتوقف عن تناول الدواء واتصل بطبيبك.

الجرعة المفرطة

في حالة تناول جرعة زائدة يجب ملاحظة أعراض خمول في الجهاز العصبي المركزي، جفاف الفم، عدم الراحة في البطن، الغثيان والقيء، الإمساك، احتباس البول و نقص حركة الأمعاء.

يمكن أن يسبب اللوبيراميد مشاكل في ضربات القلب.

قد يكون الأطفال أكثر حساسية من البالغين للتأثيرات على الجهاز العصبي المركزي. إذا ظهرت أعراض الجرعة الزائدة، يمكن استعمال النالوكسون كترقياق.

القيادة أو استخدام الآلات

يجب توخي الحذر عند قيادة المركبات أو استخدام الآلات.

الحمل والارضاع

لا ينصح بتناول أدياريكس ديو[®] أثناء الحمل دون استشارة طبية خاصة خلال الثلاثي الأول من الحمل.

تمر كميات قليلة جدا من اللوبيراميد في حليب الام، لذا لا ينصح بتناول أدياريكس ديو أثناء الرضاعة الطبيعية، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

التفاعل مع الأدوية الأخرى

يسبب الاستعمال المتزامن للوبيراميد بتراكيز عالية مع الكينيدين ، الريتونافير ، الإينراكوتازول ، اليميغيبوزول و كيتيروفان الكينوتوكونازول زيادة في تركيز البلازما للوبيراميد.

يسبب الاستعمال المتزامن للوبيراميد

وديسومبر يسين زيادة في تركيز الديسموبريسين في البلازما.

من غير المتوقع حدوث تفاعل بين سيمتيكون وأدوية أخرى.

الأعراض الجانبية

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، على الرغم من عدم

حصولها مع الجمع

آثار متعلقة بوجود اللوبيراميد :

- الشائعة: غثيان، انتفاخ البطن، صداع، فقدان الذوق.
- أقل شيوعاً: الغثاس، الدوخة، الإمساك، عسر الهضم، وانتفاخ البطن، تقيء، جفاف الفم، طفح جلدي.
- نادرة: زيادة حجم البطن.
- التردد غير المعروف : فقدان أو انخفاض في الوعي، الطفح الجلدي ، شرى، الحكة والتعب.
- نادرة: فقدان أو انخفاض في الوعي، الطفح الجلدي، شرى، حكة، والتعب.

شروط الحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل العلبه الأصلية.

يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

لا يجب تجلوز تاريخ الانتهاء المدون على العلبه

مقرر التسجيل رقم

شروط الاستطباب : يصفرون بدون وصفة طبية

تاريخ تحديث النشرة : ماي 2020



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معين :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم