

GLYCERINE LS[®]

Glycérol 1,80g - 1,20g - 0,72g

FORME ET PRESENTATION

Boîte de 10 suppositoires translucides, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION

Glycérol 1,80 g
ou 1,20 g
ou 0,72 g
Excipients q.s.p. 1 suppositoire

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Laxatif.

INDICATIONS

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation basse notamment par dyschésie rectale, ainsi que dans la préparation aux examens endoscopiques du rectum.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie et mode d'administration

Voie rectale. Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction par voie rectale.

Posologie

Traitement de la constipation basse :

Adulte : 1 suppositoire de GLYCERINE LS Adulte 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération

Enfants de 2 à 6 ans : 1 suppositoire de GLYCERINE LS enfant 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération .

Enfants de plus de 6 ans : 1 suppositoire de GLYCERINE LS enfant 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération à renouveler éventuellement dans la demi-heure où l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.

Bébé : 1 suppositoire de GLYCERINE LS bébé 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération avec interruption de 24 heures tous les 3 jours.

Préparation aux examens endoscopiques du rectum :

1 suppositoire GLYCERINE LS 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

Durée de traitement

Le traitement de la constipation ne doit pas, en moyenne, dépasser 10 jours.

CONTRE INDICATIONS

Ce médicament est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au glycérol ou à l'un des autres composants.
- Colopathie obstructive, compte tenu de l'effet laxatif du médicament.
- Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire (rectocolite ulcéreuse, maladie de CROHN).

MISES EN GARDE

- Une utilisation prolongée est déconseillée.
- Chez l'enfant et le bébé, la prescription de laxatifs par voie rectale doit être exceptionnelle. Elle doit prendre en compte le risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.
- Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique comportant :
 - Enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons,
 - Augmentation de l'activité physique .

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser ce médicament dans les cas de crises hémorroïdaires, de fissures anales, de rectocolites hémorragiques et de maladie colique

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Absence de données cliniques. Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Demander conseil à votre médecin ou pharmacien avant l'utilisation de ce médicament.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions cliniquement significatives.

EFFETS INDESIRABLES

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et exceptionnellement des inflammations du rectum.

SURDOSAGE

En cas d'utilisation excessive ou prolongée, risque accru de rectite et de diarrhée. Arrêter le traitement ou diminuer la posologie. Il faut rétablir l'équilibre hydro électrolytique pour éviter la déshydratation.

CONDITION DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.
NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

DE N°:

GLYCERINE LS ADULTE : 14/10 M 070/231

GLYCERINE LS ENFANT : 14/10 M 069/231

GLYCERINE LS BEBE : 14/10 M 124/231

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE

Février 2021.

D.E.N° 14/10 M 070/231

D.E.N° 14/10 M 124/231

D.E.N° 14/10 M 069/231



غليسيرين ل س[®]

غليسيرول 1,80 غ - 1,20 غ - 0,72 غ

النتيجة عن التهاب (التهاب القولون التقرحي، مرض كرون)

تحذيرات

- لا ينصح بالاستعمال المطول لهذا الدواء عند الرضع و الأطفال، يجب أن يكون وصف المسهلات الشرجية استثنائي مع الأخذ بالاعتبار خطر إعاقة النشاط الطبيعي للتبرز.
الدواء العلاجي مجرد وسيلة مساعدة لنمط غذائي صحي منتظم يتضمن:
- تعزيز النظم الغذائي بالألياف النباتية والسوائل.
- زيادة النشاطات البدنية.

احتياطات الاستعمال

عدم استعمال هذا الدواء في حالة أزمات البواسير، شقوق الشرج و التهاب القولون التقرحي وأمراض القولون.

الحمل والرضاعة

نظرا لبيانات المتاحة هذا الدواء يجب أن يستعمل بحذر خلال فترة الحمل والإرضاع استشير طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

التداخلات الدوائية

البيانات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى وجود تفاعلات ذات آثار سريرية ظاهرة.

التأثيرات الجانبية

الاستعمال المطول قد يؤدي إلى إحساس بحرق شرجية و التهاب المستقيم بشكل استثنائي

الجرعة المفرطة

في حالة الاستعمال المفرط أو المطول خطر حدوث التهاب الشرج و إسهال شديد. يجب إيقاف العلاج أو خفض الجرعة و إعادة التوازن المائي الشاردي لمنع الجفاف.

شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25م° لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.
لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.

مقرر التسجيل رقم

غليسيرين ل س للكبار : 14/10 M 070/231
غليسيرين ل س للأطفال : 14/10 M 069/231
غليسيرين ل س للرضع : 14/10 M 124/231

تاريخ تحديث النشرة

فيفري 2021

شكل و تقديم
تحميلات: تحتوي العلبة على 10 تحميلات شفافة.

التركيب

غليسيرول 1,80 غ
..... 1,20 غ
..... 0,72 غ
سواغ ك.ك.ل 1 تحميلة

الفئة العلاجية

مسهل

دواعي الاستعمال

يستعمل هذا الدواء للعلاج العرضي للامساك بما في ذلك عسر التبرز، أو الاستعداد لفحص المستقيم بالمنظار.

الجرعة و طريقة الاستعمال

طريقة و كيفية الاستعمال :

عن طريق الشرج
يمكن نقع التحميلة في الماء قبل الاستعمال لتسهيل العملية
الجرعة

علاج الامساك :

الكبار : 1 تحميلة من غليسيرين ل س للكبار يوميا 5 الى 30 دقيقة قبل الوقت المختار للتبرز

الأطفال من 2 الى 6 سنوات : 1 تحميلة من غليسيرين ل س للأطفال 5 الى 30 دقيقة قبل الوقت المختار للتبرز

الأطفال 6 سنوات فما فوق : 1 تحميلة من غليسيرين ل س للأطفال 5 الى 30 دقيقة قبل الوقت المختار للتبرز،

يمكن إضافة تحميلة اخرى بعد نصف ساعة في حالة الامساك المتواصل.

الرضع : 1 تحميلة من غليسيرين ل س للرضع 5 الى 30 دقيقة قبل الوقت المختار للتبرز مع التوقف عن العلاج مدة 24 ساعة كل 3 أيام.

التحضير لفحص المستقيم بالمنظار

1 تحميلة من غليسيرين ل س 5 الى 30 دقيقة قبل الوقت المختار للتبرز

مدة العلاج

علاج الإمساك لا يجب أن يتعدى على العموم 10 أيام.

موانع الاستعمال

في الحالات التالية

- حساسية مفرطة للغليسيرول أو لأحد المكونات
- متلازمة انسداد القولون مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير الملين للدواء
- متلازمة آلام البطن ذات المصدر الغير معروف أو



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معين :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم