

NIFLUMENE®

Acide niflumique 200mg



FORME ET PRESENTATION

Suppositoires : boîte de 08

COMPOSITION

Par suppositoire

Morniflumate : 200 mg
Ou 400 mg
Ou 700 mg

Excipient glycérides hémysynthétiques q.s. p 1suppositoire

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

NIFLUMENE 200 mg et NIFLUMENE 400 mg sont réservés à l'enfant à partir de 6 mois.

NIFLUMENE 700 mg est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.

Ils sont indiqués :

- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde, et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
- En traitement symptomatique de courte durée des douleurs aiguës d'arthroses, et de certaines inflammations du pourtour des articulaires tels que tendinites, bursites.
- En traitement de certaines douleurs dues à une inflammation de la gorge, des oreilles ou de la bouche.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (CONTRE-INDICATIONS)

au delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée .

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine).
- Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
- Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- Antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution ou récidivant.
- Maladies graves du foie.
- Maladies graves des reins.
- Maladies graves du cœur.
- Inflammation ou saignement récent du rectum (liée à la voie d'administration).
- Nourrisson moins de six mois.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN, notamment autre anti-inflammatoire non stéroïdien, corticostéroïdes, anticoagulants oraux, aspirine à forte dose, héparine injectable, autres anti-agrégant plaquettaire comme la ticlopidine, lithium, méthotrexate à forte dose, , inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

certaines antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), pemetrexed, ciclosporine, tacrolimus

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse :

votre médecin peut être amené à vous prescrire ce médicament au cours du 1er trimestre.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus, ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève.

vous ne devez en aucun cas prendre ce médicament au delà de 5 mois de grossesse.

Allaitement :

ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tout médicament NIFLUMENE 200 mg, 400 mg et 700 mg suppositoires, sont susceptibles d'avoir des effets indésirables.

Il est indispensable d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir votre médecin en cas :

- de réactions allergiques cutanées de type éruption sur la peau, de démangeaisons, fortes réactions de la peau lors d'une exposition au soleil ou aux UV, rarement, des lésions bulleuses (de type ampoules) sur les muqueuses ou la peau,
- de réactions allergiques respiratoires de type crise d'asthme.
- de réactions allergiques générales de type choc allergique.
- d'hémorragies digestives.
- Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE SUR CETTE NOTICE.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES.

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner vertiges et somnolence.

COMMENT UTILISER

NIFLUMENE 200 mg , NIFLUMENE 400 mg et NIFLUMENE 700 mg suppositoires,

Mode et voie d'administration : voie rectale.

Posologie: elle est fonction de l'indication et de l'âge de l'enfant.

- Age de 6 mois à 30 mois : 1 suppositoire de NIFLUMENE 200 mg, 2 fois par jour.
- Age de 30 mois à 12 ans : 1 suppositoire de NIFLUMENE 400 mg par 10 kg de poids et par jour sans dépasser 3 suppositoires par jour.
- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 suppositoire de NIFLUMENE 700 mg, 2 fois par jour, soit 1400 mg de morniflumate par 24 heures.

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité locale.

Si vous avez pris plus de NIFLUMENE 200 mg, 400 mg ou 700 mg suppositoires que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre votre médicament : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Conserver NIFLUMENE 200 mg, 400 mg et 700 mg suppositoires entre 15°C et 25°C dans son emballage d'origine.

Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Liste II

DE N° : 09/04B 064/231

06/04B 031/231

09/04B 030/231

Date de mise à jour de la notice: Décembre 2015.

D.E. N° 09/04B 064/231



Médicaments non utilisés à rapporter en pharmacie



Plaque plastique vide à jeter

Etui carton vide à recycler



نفلومان[®]

حامض النفلوميك 200 مغ

بعدم استخدامه أثناء فترة الإرضاع. اطلبوا استشارة طبيبك أو الصيدلي.

شكل و تقديم

تحميلات : عبة 08 تحميلات

ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة غير المرغوب فيها ؟
ككل دواء نفلومان 200 مغ، نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات يمكن أن يكون له تأثيرات غير مرغوب فيها تتطلب التوقيف الفوري للعلاج وتنبهه الطبي ب في حالة حدوث :

- حساسية جلدية من نوع طفح جلدي، حكة، تأثر شديد للجلد عند التعرض للشمس أو للأشعة فوق البنفسجية، نادرا جرح فقاعي على مستوى الجلد و الأنسجة المخاطية.

- حساسية تنفسية من نوع أزمة الربو.
- تأثيرات عامة من نوع صدمة حساسية.
- نزيف هضمي.
- استثناءيا لوحظت انتانات جلدية خطيرة في حال وجود مرض الجدري. أبلغوا طبيبك أو الصيدلي بالتأثيرات غير المرغوب فيها و المزعجة التي لم تذكر في هذه الوصفة.

قيادة المركبات و استعمال الآلات

نادرا قد يتسبب هذا الدواء في دوار و نعاس.

كيف يستعمل نفلومان 200 مغ ، نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات؟

كيفية و طريق الاستعمال: عن طريق الشرح مقادير الاستعمال: حسب التعليمات و سن الطفل.

- من 6 أشهر إلى 30 شهر : تحميلة من نفلومان 200 مغ مرتين في اليوم.
- من 30 شهر إلى 12 سنة : تحميلة من نفلومان 400 مغ لكل 10 كغ من الوزن مرة واحدة في اليوم دون ان تتعدى 3 تحميلات في اليوم
- سنة : تحميلة من نفلومان 400 مغ مرتين في اليوم أي ما يعادل 1400 مغ من مرنفلومات خلال 42 ساعة.

إن استعمال الطريق الشرجي يجب أن يكون قصير المدى بسبب احتمال تسبب موضعي. إذا استعملت نفلومان 200 مغ أو نفلومان 400 مغ أو نفلومان 700 مغ تحميلات أكثر من اللازم، عليك أن تبلغ طبيبك أو الصيدلي فوراً. إذا نسبت استعمال نفلومان 200 مغ و نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات: لا تضاعف الجرعة لتعويض ما نسبت.

شروط الحفظ

لا تتجاوز المدة المحددة للاستعمال التي تظهر على التغليف الخارجي. أحفظوا نفلومان 200 مغ، نفلومان 400 مغ و نفلومان 700 مغ تحميلات بين 15م° و 25م° في العبوة الأصلية.

لا تترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

شروط الاستطباب

قائمة II

مقرر التسجيل رقم : 09/04B 064/231

06/04B 031/231

09/04B 030/231

تاريخ تحديث النشرة : ديسمبر 2015

التركيب: في التحميله
مورنفلومات 200 مغ
أو 004 مغ
أو 007 مغ

سواغ : غليسيريدي نصف تركيبي ك.ك.ك. 1 تحميله

في أي حالة يستعمل هذا الدواء ؟

يستعمل نفلومان 200 مغ و نفلومان 400 مغ تحميلات عند الأطفال ابتداء الشهر السادس. يستعمل نفلومان 700 مغ تحميلات عند البالغين والأطفال ابتداء من 12 سنة.

يوصف نفلومان في معالجة الحالات التالية :

- علاج طويل المدى لبعض حالات الالتهابات الرئوية المزمنة، التهاب المفصل الفقاري و بعض حالات الفصال المؤلمة و المعجزة .
- علاج قصير المدى لبعض حالات الفصال، رثية المفصل، التهاب الوتر و التهاب الجراب.
- علاج لبعض الآلام بسبب التهابات الحلق، الأذن أو الفم.

يمنع استعمال هذا الدواء في الحالات التالية

- فوق 5 أشهر منقضية من الحمل (24 أسبوع منذ احتباس الطمث)
- سوابق حساسية أو الربو بسبب تناول هذا الدواء أو دواء مماثل، خاصة مضادات التهاب غير ستيرويدية، حمض اسيتيل ساليسيليك (أسبرين).
- سوابق نزيف في الجهاز الهضمي أو قرحة بسبب علاجات سابقة بمضادات الالتهاب غير ستيرويدية.
- سوابق نزيف في الجهاز الهضمي، نزيف دماغي أو أي نزيف آخر موجود.
- سوابق حساسية لمكونات أخرى للتحميله.
- أمراض كبدية خطيرة.
- أمراض كلوية خطيرة.
- أمراض قلب خطيرة.
- التهاب أو نزيف حديث للمستقيم (مرتبط بطريقة الاستعمال).
- رضخ أقل من 6 أشهر.

التداخلات الدوائية

من أجل تجنب احتمال تداخلات عدة أدوية يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالعلاج المتبع ، خاصة مضاد التهاب آخر غير ستيرويدي، ستيرويدات قشرية، مضادات التخثر المتناولة عن طريق الفم، الأسبرين بجرعة قوية أخرى الهبرين بالحقن، مضادات تخثر مثل تكلويدين ، الليثيوم ، ميتوتركسات بجرعات قوية، مثبطات الإنزيم المحول للانجيوتنسين، مدرات البول ، حاصرات مستقبلات بيتا ، ضادات مستقبلات الانجيوتنسين II، بعض مضادات الاكتئاب (مثبطات انتقائية إعادة امتصاص السيروتونين) ، بيميتركسيد سيكلوسبورين، تاكروليموس.

الحمل و الرضاعة

الحمل : قد يكون طبيبك في حاجة لوصف هذا الدواء أثناء الثلاثي الاول. عند 2,5 إلى 5 أشهر منقضية من الحمل فإنه لا يسمح بأخذ هذا الدواء إلا باستشارة الطبيب و بصفة وجيزة. لا يجب في أي ظرف من الظروف أخذ هذا الدواء بعد 5 أشهر من الحمل و ما فوق

الرضاعة : ينتقل هذا الدواء في حليب الام، من باب الحيطة و الحذر يوصى



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معبئ :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم