

# PROCTOLON NEO<sup>®</sup>

Tribénoside/Lidocaïne 400/40 mg



## PRESENTATION

Ce médicament se présente sous forme de 08 suppositoires sous plaquettes thermoformées.

## COMPOSITION

Tribénoside ..... 400,0 mg  
Lidocaïne ..... 40,0 mg  
Excipients ..... q.s.p. 1 suppositoire

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Anti hémorroïdaire.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

PROCTOLON NEO suppositoires est utilisé dans le traitement local des hémorroïdes internes et des troubles qu'elles provoquent.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser PROCTOLON NEO en cas d'allergie à l'un des principes actifs ou l'un des excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

Le PROCTOLON NEO ne doit pas être utilisé sans avis médical, seul le médecin pourra poser le diagnostic

### Consulter votre médecin en cas :

- De maladie cardiaque ou hépatique.
- De perte de sang ou de suspicion de sang dans les matières fécales, ainsi qu'en cas d'apparition concomitante de douleurs anales et de fièvre.
- Persistance plus de 14 jours ou aggravation de l'état ou si les symptômes sont inhabituels ou nouveaux.
- D'apparition des réactions d'hypersensibilité avec arrêt immédiat du traitement.

Ce médicament ne convient pas aux enfants.

Si vous souffrez d'hémorroïdes, vous devriez renoncer aux aliments fortement épicés et choisir une alimentation favorisant la formation de selles molles (alimentation végétale légère, avant tout.)

Vous devriez éviter de prendre du poids ou réduire une éventuelle surcharge pondérale et veiller à une bonne hygiène anale. Ces mesures vous permettront d'appuyer l'effet de PROCTOLON NEO.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

### Mode d'administration

Par voie rectale, avant toute utilisation il faut :

- Se laver soigneusement les mains avant et après utilisation,
- Nettoyer la zone concernée avec un tissu doux ou une serviette et sécher délicatement,
- Ne pas utiliser d'aides telles que de la vaseline ou des huiles pour faciliter l'insertion.

### Posologie

Lors de troubles aigus utilisation d'un suppositoire matin et soir. Poursuite du traitement après la disparition des troubles aigus : 1 suppositoire matin ou soir.

Il faut noter que le PROCTOLON NEO ne convient pas aux enfants.

## Durée de traitement

L'utilisation de PROCTOLON NEO ne dépassera pas 2 semaines

## SURDOSAGE

Si vous avez avalé du PROCTOLON NEO ou si vous avez dépassé la posologie recommandée, vous devriez consulter un médecin.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

PROCTOLON NEO ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, particulièrement pendant les trois premiers mois, ni pendant l'allaitement sauf sur ordonnance médicale explicite.

Dans ce cas, l'allaitement doit être arrêté.

## CONDUITE DE VEHICULE ET UTILISATION DE MACHINES

Aucune étude correspondante n'a été réalisée

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

La lidocaïne devrait être utilisée avec prudence chez les patients qui prennent des bêta-bloquants ou d'autres antiarythmiques, car les effets toxiques potentiels sont additifs.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, Le PROCTOLON NEO peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde.

**Très rares :** des réactions allergiques graves (réactions anaphylactiques) peuvent apparaître :

- Respiration haletante, souffle court ou sensation d'oppression dans la poitrine (asthme)
- Difficultés pour avaler
- Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou au niveau de la gorge
- Fortes démangeaisons avec éruption cutanée rouge et/ou soulèvement de la peau
- Battements cardiaques irréguliers.

**Rarement :** réactions cutanées comme une sensation de brûlure, des démangeaisons ou des rougeurs peuvent survenir. Ces réactions peuvent apparaître à l'endroit où la préparation a été appliquée ou s'étendre à partir de là.

Arrêter le traitement avec PROCTOLON NEO et consulter immédiatement un médecin, si vous remarquez un ou plusieurs autres symptômes.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans son emballage d'origine.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

## DE N° :

Date de révision de la notice : Mars 2020





# بروكتولون نيو<sup>®</sup>

## تريبنوزيد/ليدوكاين 40/400 مغ

### شكل وتقديم

تحميلات تقدم على شكل علبه ب 8 تحميلات

### الترييب

تريبنوزيد ..... 400 مغ  
ليدوكاين ..... 40 مغ  
سواغ ..... 1 ك.ك.ك. 1 تحميلة

### الفئة العلاجية

هذا الدواء مضاد لداء البواسير.

### دواعي الاستعمال

يستعمل بروكتولون نيو في العلاج المحلي للبواسير الداخلية والاضطرابات التي تسببها.

### موانع الاستعمال

لا يجب استعمال بروكتولون نيو إذا كان لديك حساسية من المواد الفعالة أو أي من السواغات.

### احتياطات الاستعمال و تحذيرات خاصة

لا يجب استعمال بروكتولون نيو دون استشارة طبية، فقط الطبيب يمكنه إجراء التشخيص.

### استشر طبيبك في حالة :

- أمراض القلب أو الكبد.
- فقدان الدم أو اشتباه وجوده في البراز، وكذلك في حالة ظهور ما يصاحب ذلك من آلام في الشرج وحمى.
- استمرار الوضع لأكثر من 14 يوماً أو ازدياده سوءاً أو إذا كانت الأعراض غير عادية أو جديدة.
- ظهور تفاعلات فرط الحساسية مع التوقف الفوري عن العلاج.

هذا الدواء غير مناسب للأطفال.

إذا كنت تعاني من البواسير، يجب عليك التخلي عن الأطعمة مع بهارات حارة واختيار نظام غذائي الذي يعزز تكوين براز رخو (طعام نباتي خفيف، قبل كل شيء).

يجب تجنب زيادة الوزن أو تقليل الوزن الزائد المحتمل وضمان النظافة الجيدة للشرج. تساعد هذه الاجراءات على دعم تأثير بروكتولون نيو.

### الجرعة وطريقة الاستعمال

#### طريقة الإستعمال :

يستعمل بروكتولون نيو عن طريق الشرج، قبل أي استعمال :

- اغسل يديك جيداً قبل وبعد الاستخدام ،
- تنظيف المنطقة المصابة بقطعة قماش ناعمة أو منشفة وتجفيفها برفق ،
- لا تستخدم مساعداً مثل الفازلين أو الزيوت لتسهيل الإدخال.

### الجرعة

في حالة الاضطرابات الحادة: تحميلة صباحاً وواحدة أخرى مساءً. استمرار العلاج بعد اختفاء الاضطرابات الحادة : تحميلة واحدة صباحاً أو مساءً.

بروكتولون نيو غير موصى به عند الأطفال.

**مدة العلاج :** لا تتجاوز مدة استعمال بروكتولون نيو أسبوعين.

### الجرعة المفرطة

إذا تناولت بروكتولون نيو أو إذا تجاوزت الجرعة الموصى بها ، يجب استشارة الطبيب.

### الحمل والارضاع

لا ينبغي استخدام بروكتولون نيو أثناء الحمل ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، ولا أثناء الرضاعة الطبيعية الا بوصفة طبية واضحة في هذه الحالة ، يجب إيقاف الرضاعة الطبيعية.

### القيادة أو استخدام الآلات

لم يتم إجراء أي دراسة مطابقة.

### التفاعل مع الأدوية الأخرى

يستعمل اليدوكاين بحذر عند المرضى الذين يتعالجون بحاصرات بيتا أو مضادات اضطراب نظام القلب الأخرى ، لاحتمال زيادة التأثيرات السامة.

### الأعراض الجانبية

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب بروكتولون نيو آثاراً جانبية ، على الرغم من عدم حصولها للجميع .

**نادر جداً :** قد تحدث تفاعلات حساسية شديدة (تفاعلات الحساسية) :

- اللهث ، ضيق في التنفس أو ضيق في الصدر (الربو).
- صعوبة البلع
- انتفاخ الوجه الشفاه واللسان و/ أو الحلق
- حكة شديدة مع طفح جلدي أحمر و / أو شد الجلد
- عدم انتظام ضربات القلب.

**نادراً :** قد تحدث تفاعلات جلدية مثل الإحساس بالحرقه أو الحكة

أو الاحمرار قد تظهر ردود الفعل هذه في موضع تطبيق

التحضير أو امتدت من هناك، إذا لاحظت واحداً أو أكثر من هذه

الأعراض، توقف عن أخذ بروكتولون نيو و أطلب استشارة طبية فوراً

### شروط الحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل العبلة الاصلية. يحفظ بعيداً عن متناول و نظر الأطفال.

لا يجب تجاوز تاريخ الانتهاء المدون على العبلة الخارجية.

### مقرر التسجيل رقم :

تاريخ تحديث النشرة : مارس 2020

