



SIMEXANE®

Siméticone / Phloroglucinol 125/80 mg



FORME ET PRESENTATION

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 60 gélules.

COMPOSITION

Siméticone	125 mg
Phloroglucinol dihydraté	80 mg
Excipients	q.s.p. 1 gélule

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antiflatulent associé à un antispasmodique.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est préconisé dans le soulagement des douleurs du ventre avec ballonnement et/ou émission de gaz associées ou non à des diarrhées légères.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Posologie :

2 gélules, 3 fois par jour. A prendre avec un verre d'eau avant les repas ou au moment des douleurs.

Mode d'administration :

Voie orale.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à la siméticone, au phloroglucinol ou à l'un des composants de ce médicament.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

Précautions d'emploi :

- Ballonnement, flatulences : éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...) et certains légumes verts (choux, bettes...).
- Diarrhée : adjoindre à ce traitement des boissons sucrées, des bouillons salés pour compenser les pertes en liquide dues à la diarrhée.

Si la diarrhée persiste au-delà de 2 jours, consultez votre médecin.

Mises en garde spéciales :

L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmodique.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions cliniquement significatives.

Cependant si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Fertilité :

Sans objet.

Grossesse :

Eviter l'administration de ce médicament pendant les trois premiers mois de la grossesse.

Allaitement :

Eviter l'administration de ce médicament pendant l'allaitement.

EFFET SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHI- CULES ET A UTILISER DES MACHINES

Ce médicament n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de réactions allergiques qui peuvent se manifester par : des boutons, des rougeurs sur la peau, des démangeaisons, œdème de Quincke ou un choc anaphylactique.

Si vous développez ces symptômes ou vous remarquez d'autres effets indésirables non mentionnés, arrêtez d'utiliser ce médicament et consultez votre médecin.

SURDOSAGE

Sans objet.

INCOMPATIBILITES

Sans objet.

DUREE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C dans son emballage d'origine.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR

Plaquettes thermoformées (PVC/PVDC Transparent / Aluminium) conditionnées dans un étui en carton.

PRECAUTIONS PARTICULIERES D'ELIMINATION ET DE MANIPULATION DES MEDICAMENTS UTILISES OU DES DECHETS DERIVES DE CES MEDICAMENTS, LE CAS ECHEANT

Sans objet.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.

NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR ET L'EXPLOITANT DE LA D.E.

SARL Laboratoires SALEM, zone industrielle El Eulma 19600 - Algérie.

NOM ET ADRESSE DES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS LA FABRICATION DU PRODUIT FINI (Production et libération)

SARL Laboratoires SALEM, zone industrielle El Eulma 19600 - Algérie.

NUMERO DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT :

17/10 B 119/231.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE :

Mars 2022.

DEN° 17/10 B 119/231

LABORATOIRES SALEM

DÉTENTEUR ET EXPLOITANT DE LA DE, FABRICANT (PRODUCTION ET LIBÉRATION)
SARL Laboratoires SALEM Z.I. El Eulma 19600 - Algérie.
www.labosalem.com





سيميكسان[®]

سيميتيكون/ فلوروغلوسينول 80/ 125 مغ

شكل و تقديم

يقدم هذا الدواء على شكل كبسولات. علبه تحتوي على 60 كبسولة.

الإرضاع :

يجب تجنب تناول هذا الدواء أثناء الإرضاع.

التركيب

سيميتيكون 125 مغ
ثاني هيدرات الفلوروغلوسينول 80 مغ
سواغ ل.ك.ل 1 كبسولة

الفئة العلاجية

مضاد لانتفاخ البطن مع مضاد للتشنج.

دواعي الاستعمال

يوصف هذا الدواء لتخفيف الآم البطن المصحوبة بالانتفاخ و/ أو خروج الغازات المصحوب أو لا بأسهال خفيف.

الجرعة و طريقة الاستعمال

الجرعة :

كبسولتان ، 3 مرات في اليوم.
تؤخذ مع كأس من الماء قبل وجبات الأكل أو وقت الألم

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم.

موانع الاستعمال

يمنع استعمال هذا الدواء في حالة حساسية للسيميتيكون ، للفلوروغلوسينول أو لأحد مكونات هذا الدواء.

احتياطات الاستعمال و تحذيرات خاصة

احتياطات الاستعمال :

- الانتفاخ و الغازات : تجنب البقوليات (العدس ، الفاصوليا ، البازلاء...) ،
و بعض الخضراوات (الكرفس ، السلق...)
- الإسهال : إضافة المشروبات السكرية و السوائل المالحة إلى هذا
العلاج لتعويض السوائل المفقودة نتيجة الإسهال.
إذا استمر الإسهال أكثر من يومين ، فاستشر طبيبك.

تحذيرات خاصة :

تجنب أخذ الفلوروغلوسينول مع المسكنات الرئيسية كالمورفين أو مشتقاتها
بسبب تأثيرها التشنجي.

التداخلات الدوائية و التداخلات الأخرى

لا تشير البيانات المتاحة حتى الآن إلى وجود تفاعلات سريرية مهمة.
ومع ذلك ، إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أدوية أخرى ، بما في
ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية ، فاستشر
طبيبك أو الصيدلي.

الخصوبة ، الحمل و الإرضاع

الخصوبة :

لا ينطبق.

الحمل :

يجب تجنب تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

التأثير على قدرة قيادة المركبات واستخدام الآلات

لا يؤثر هذا الدواء على قدرة قيادة المركبات أو استخدام الآلات.

الأعراض الجانبية

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب سيميكسان آثارا جانبية ، على الرغم
من عدم حدوثها لدى الجميع.
احتمال حدوث تفاعلات حساسية و التي قد تظهر في شكل : بثور ، احمرار
الجلد ، حكة ، ودمة و عاتية أو صدمة حساسية.
إذا ظهرت لديك هذه الأعراض أو لاحظت آثارا جانبية أخرى غير
مذكورة ، توقف عن استخدام هذا الدواء و استشر طبيبك.

الجرعة المفرطة

لا ينطبق.

عدم التوافق

لا ينطبق.

مدة و شروط الحفظ

- لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبه الخارجيه.
- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية في علبته الأصلية.
- يحفظ بعيدا عن متناول و عن نظر الأطفال.

طبيعة و محتوى الغلاف الخارجي

صفائح مشكلة حراريا (بولي فينيل كلوريد / بولي فينيلبيدين كلوريد الشفاف
/المونيوم) معبأة داخل علبه من الورق المقوى.

احتياطات خاصة للتخلص و التعامل مع الأدوية المستعملة أو النفايات الناتجة عنها ، إذا لزم الأمر

لا ينطبق.

شروط الصرف

يصرف بدون وصفة طبية.

اسم و عنوان حامل و مستغل مقرر التسجيل

ش.ذ.م.م. مخابر سالم المنطقة الصناعية العلمة 19600 - الجزائر.

اسم و عنوان مختلف الأطراف المشاركة في تصنيع المنتج النهائي (إنتاج و تحرير)

ش.ذ.م.م. مخابر سالم المنطقة الصناعية العلمة 19600 - الجزائر.

رقم مقرر التسجيل :

17110 B 119/231

تاريخ تحديث النشرة :

مارس 2022.



حامل و مستغل مقرر التسجيل ، مصنع (إنتاج و تحرير) :
ش.ذ.م.م. مخابر سالم م.ص. العلمة 19600 - الجزائر.
www.labosalem.com

مخابر
سالم