

SPASMOL®

Phloroglucinol/triméthylphloroglucinol 150/150 mg



FORME ET PRESENTATION

Suppositoires : boîte de 10

COMPOSITION

Phloroglucinol 150,00 mg
Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 116,70 mg
Triméthylphloroglucinol 150,00 mg
Excipients glycérides héli-synthétiques q.s pour un suppositoire

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Utilisé dans le traitement :

- des coliques néphrétiques et des douleurs des voies urinaires,
- des coliques hépatiques et des douleurs biliaires, des colites spasmodiques, des douleurs intestinales,
- des douleurs des règles et des spasmes de l'utérus pendant la grossesse.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie au phloroglucinol ou à l'un des composants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET

VOIE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Prendre 1 suppositoire, 3 fois par jour en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre

chaque prise sans dépasser 3 suppositoires par 24 heures. Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.

Voie d'administration :

par voie rectale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions avec d'autres médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que si nécessaire, et sur les conseils de votre médecin. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner en cours de traitement des effets plus ou moins gênants. Quelques très rares réactions cutanées.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

Ce médicament doit être conservé à température entre 10°C et 25°C.

Ne jamais laisser ce médicament à portée des enfants.

CONDITION DE PRESCRIPTION

Médicament non soumis à une prescription médicale.

DE N° : 03/10 E 039/231.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Avril 2018

DE N° : 03/10 E 039/231

LABORATOIRES SALEM

Détenteur de DE. Fabricant. Conditionneur :
LABORATOIRES SALEM - Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE
www.labosalem.com





سباسمول[®]

فلوروغلوسينول/ تريميثيل فلوروغلوسينول 150/150 مغ

شكل وتقدير

تحميلات : علبه ب 10 تحميلات

كيفية الاستعمال

عن طريق الشرح.

الترييب

فلوروغلوسينول 150,00 مغ
الكمية الموافقة لفلوروغلوسينول انيدر 116,70 مغ
تريميثيل فلوروغلوسينول 150,00 مغ
سواغ غليسيريدي نصف ترييب ك.ك. ل 1 تحميله

احتياطات الاستعمال

لتجنب أي تداخلات وتفاعلات دوائية محتملة بين عدة أدوية من الضروري إخبار الطبيب أو الصيدلي بكل علاج متبع.

الحمل والإرضاع

لا يستعمل هذا الدواء أثناء فترة الحمل إلا إذا تطلبت الحالة وتحت نصائح الطبيب المعالج. لا يستعمل هذا الدواء أثناء فترة الإرضاع.

الفئة العلاجية

مضاد للتشنج. موجه للععضل.

تأثيرات جانبية

مثل كل مستحضر فعال قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص أثناء فترة العلاج تأثيرات نوعا ما مزعجة تتمثل في بعض حالات الحساسية الجلدية النادرة.

دواعي الاستطباب

يستعمل هذا الدواء في معالجة :

- مغص كلوي وآلام المسالك البولية.
- مغص كبدي وآلام الحوصلة الصفراوية.
- مغص تشنجي وآلام الأمعاء.
- الام الطمث وتشنجات الرحم أثناء فترة الحمل.

شروط الحفظ

لا يستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على الغلاف الخارجي. يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة ما بين 10°م و 25°م. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

مضادات الاستعمال

لا يستعمل هذا الدواء في حالة حساسية للفلوروغلوسينول أو أحد المكونات الأخرى. في حالة الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

شروط الاستطباب

هذا الدواء لا يخضع لوصفة طبية.

مقرر التسجيل رقم : 03/10 E 039/231

تاريخ تحديث النشرة : أفريل 2018

الجرعة وكيفية الاستعمال

الجرعة :

استعمال تحميله ، 3 مرات في اليوم مع احترام ساعتان كحد أدنى بين كل جرعة دون تجاوز 3 تحميلات في 24 ساعة. هذه الجرعة ليست مناسبة للطفل.



حامل مقرر التسجيل، مصنع معين :
مخبر سالم - م.ج. 19600 العنمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخبر
سالم

رج.ت. 03/10E 039/231

