

# VIT.D3 SALEM®

## Cholecalciférol 200.000 UI



### FORME ET PRESENTATION

Ce médicament se présente sous forme d'une ampoule buvable sous plaquettes thermoformées.

### COMPOSITION

Cholecalciferol (Vitamine D3) ..... 5 mg  
(Quantité correspondante à 200.000UI)  
Excipients ..... qsp 2.2ml par ampoule

### CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Traitement et Supplément de Vitamine D.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

La VIT.D3 SALEM® 200.000UI est indiquée dans la prévention et le traitement des carences en vitamine D. Elle permet la fixation osseuse du calcium.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais ce médicament :

- En cas d'allergie à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez un excès de calcium dans le sang ou les urines, ou des calculs rénaux.

Demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter tout surdosage en vitamine D, prévenir votre médecin, en cas d'association avec un traitement contenant déjà cette vitamine.

En cas d'administration de doses fortes et répétées de vitamine D, il est nécessaire de surveiller le taux de calcium dans le sang et les urines.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

#### Mode d'administration :

Voie orale.

Le contenu de l'ampoule peut être administré pur ou dilué dans un peu d'eau (un léger trouble peut apparaître) ou le lait

#### Posologie :

Dans tous les cas, se conformer à l'avis de votre médecin

#### En prévention :

- Chez le nourrisson allaité ou ne recevant pas de lait enrichi en Vitamine D et chez l'enfant jeune jusqu'à 5 ans : 1 ampoule (soit 200 000 UI) tous les 6 mois.
- Chez l'adolescent : 1 ampoule (soit 200 000 UI) tous les 6 mois en période hivernale.

#### Traitement de la carence en vitamine D

1 ampoule (soit 200 000 UI) éventuellement répétée une fois après 1 à 6 mois. En cas de pathologie digestive, de traitement anticonvulsivant ou autres conditions particulières :

Se conformer à la prescription médicale.


#### Mode d'utilisation :

Seule l'ampoule du milieu contient le médicament.

1/ Commencer par détacher soigneusement les deux ailettes de support en suivant la ligne de pré-découpe



2/ Pour l'ouverture de l'ampoule du milieu contenant la solution de VIT.D3 SALEM, tenir l'ampoule verticalement et casser la pointe supérieure en suivant la ligne de découpe.



3/ Verser ensuite le contenu dans un verre en exerçant une légère pression de part et d'autre afin de faciliter l'écoulement de la solution.

### SURDOSAGE

En cas de surdosage, il faut arrêter le traitement, boire abondamment, limiter les apports en calcium et consulter un médecin.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de besoin, la vitamine D peut être prescrite pendant la grossesse et l'allaitement.

Cette supplémentation ne remplace pas l'administration de vitamine D chez le nouveau-né.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Sans objet.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Il faut impérativement Informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables suivants sont rapportés très rarement :

Réaction d'hypersensibilité, hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique, et notamment en cas de surdosage.

### CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25° C, à l'abri de la lumière

Ne pas conserver au réfrigérateur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

### CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

LISTE II : Uniquement sur ordonnance


DE N° : 20/14 H094/231

Date de révision de la notice : août 2019






# فيت.د3 سالم<sup>®</sup> كوليكلسيفيرول 200.000 ود



## كيفية الاستعمال

1/ يتم إزالة الأنبوثة الداعمة بعناية من الجانبين وفقا للخط المتقطع

2/ لفتح أنبوثة الوسط التي تحتوي على محلول فيت.د3 سالم، أمسك الأنبوثة عموديا و أزل الطرف العلوي على طول الخط المتقطع



3/ يتم إفراغ الأنبوثة في كأس عن طريق الضغط لتسهيل تدفق المحلول

## شكل وتقديم

يقدم هذا الدواء في شكل أنبوثة للشرب.

## التكوين

كوليكلسيفيرول (فيتامين د3) ..... (5 مغ)  
(كمية معادلة ل 200.000 ود)  
سواغ ..... ك ك ل 2.2م ل في الأنبوثة

## الفئة العلاجية

دواء ومكمل فيتامين د.

## دواعي الاستعمال

تستعمل فيت.د3 سالم<sup>®</sup> للوقاية وعلاج نقص الفيتامين د. هذا الدواء يعمل على تثبيت الكالسيوم في العظام.

## موانع الاستعمال

لا يأخذ هذا الدواء :

- في حالة حساسية تجاه المادة الفعالة أو أحد مكونات هذا الدواء
  - في حالة ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم أو البول، أو حصى الكلى.
- استشر الطبيب أو الصيدلي

## الجرعة المقررة

في حالة تناول جرعة زائدة، يجب وقف العلاج، وشرب الكثير من الماء، والحد من تناول الكالسيوم مع استشارة الطبيب.

## الحمل والارضاع

عند الضرورة، يمكن وصف فيتامين (د) أثناء الحمل والرضاعة. هذه المكملات لا تعوض جرعة الفيتامين (د) عند الأطفال حديثي الولادة.

## القيادة واستخدام الآلات

غير معروف

## التفاعل مع الأدوية الأخرى

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو قد أخذت مؤخرا أو قد تأخذ أي أدوية أخرى.

## الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا جانبية، لكن ليس عند الجميع. يتم الإبلاغ نادرا عن الأعراض الجانبية التالية :

- حساسية، ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم، ارتفاع نسبة الكالسيوم في البول، حصاة الكالسيوم وخاصة في حالة تناول جرعة زائدة.

## شروط الحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية. بعيدا عن الضوء لا يوضع بالتلاجة  
يحفظ بعيدا عن متناول و نظر الأطفال  
لا يجب تجاوز تاريخ الانتهاء المدون على العبوة.

## شروط الاستطباب

القائمة II : الا بوصفة طبية

مقرر التسجيل رقم : 20/14 H094/231

تاريخ تحديث النشرة : أوت 2019

## الجرعة وطريقة الاستعمال

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم.  
يمكن أخذ الدواء مباشرة أو مخفف في قليل من الماء (يمكن ظهور اضطراب خفيف في المحلول) أو الحليب.

الجرعة :

يجب الامتثال لوصفة الطبيب

الوقائية :

- عند حديثي الولادة الذين يرضعون أو لا يتلقون حليب مدعم

بالفيتامين (د) وعند الأطفال الصغار حتى 5 سنوات : أنبوثة

(أي 200000 وحدة دولية) كل 6 أشهر

- عند المراهقين : أنبوثة (200000 وحدة دولية) كل 6 أشهر في فصل

الشتاء

علاج نقص فيتامين د :

أنبوثة (أي 200000 وحدة دولية) يمكن تكرارها مرة بعد شهر إلى 6 أشهر في حالة أمراض الجهاز الهضمي، علاج مضاد الاختلاج أو حالات خاصة أخرى :  
يجب الامتثال للوصفة الطبية.



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معين :  
مخابر سالم - م.ص. 19600 العليمة - الجزائر  
www.labosalem.com

مخابر  
LS

20/14 H094/231